

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Цекин LC для лечения клинических маститов у лактирующих коров  
(организация-разработчик: «Vemedim Animal Health», Вьетнам)

### 1. Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Цекин LC (Sequin LC).  
Международное непатентованное наименование: цефкинома сульфат. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

В качестве действующего вещества в 10 мл препарата (1 шприц-инъектор) содержится: цефкином сульфат – 75 мг, в качестве вспомогательных веществ: бутилированный гидрокситолуол – 0.8 мг, бутилированный гидроксианизол – 0.8 мг, стеарат алюминия – 640 мг, триглицериды средней цепи до 10 мл.

По внешнему виду Цекин LC представляет собой суспензию светло-желтого цвета.

### 2. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа лекарственного средства: антибиотик, обладающий антибактериальным действием.

Цекин LC - антибактериальный препарат группы цефалоспоринов, который действует путем ингибирования синтеза клеточной стенки. Он отличается широким терапевтическим спектром действия и высокой устойчивостью к пенициллиназам и  $\beta$ -лактамазам. В отличие от цефалоспоринов предыдущих поколений, цефкином не гидролизуется хромосомно-кодируемыми цефалоспориноазами типа Amp-C или плазмидными цефалоспориноазами некоторых видов энтеробактерий. Однако некоторые  $\beta$ -лактамазы расширенного спектра (ESBL) могут гидролизовать цефкином и цефалоспорины других поколений. Потенциал развития устойчивости к цефкиному довольно низок. Высокий уровень устойчивости к цефкиному требует совпадения двух генетических модификаций - гиперпродукции специфических  $\beta$ -лактамаз, а также снижения проницаемости мембран.

### 3. Показания к применению

Цекин LC предназначен для лечения клинических маститов бактериальной этиологии у лактирующих коров.

### 4. Способ применения и дозы

Интрацистернально. Многократно.

Ввести препарат в пораженную четверть вымени. Вводить три раза с интервалом в 12 часов.

Перед применением препарата поражённую четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют сосок. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца полностью выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.

### 5. Период ожидания

Мясо: 48 часов. Молоко: 96 часов.

Молоко, полученное от коров в период лечения разрешается использовать в корм животным. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

### 6. Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к антибиотикам группы цефалоспоринов, действующим веществам препарата.

**7. Особые указания**

Не применять по истечении срока годности.

**8. Побочные эффекты**

Возможны аллергические реакции у животных с гиперчувствительностью к компонентам препарата. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические лекарственные средства.

**9. Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия**

Не смешивать Цекин LC в одном шприце с другими лекарственными средствами.

**10. Срок годности и условия хранения**

Срок годности - 3 года с даты производства. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и источников огня, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от +5°C до +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**11. Условия отпуска**

Без рецепта ветеринарного врача.

**12. Меры личной профилактики**

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещено принимать пищу, курить, пить. После работы с препаратом следует вымыть руки водой с мылом. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды. При введении препарата себе обратиться за медицинской помощью и показать вкладыш врачу.

**13. Меры по утилизации отходов**

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.**

**Регистрационное удостоверение:** № РК-ВП-4-4613-22 выдано «Вимедим Энимал Хэлс», Сонг Хау Индастриал Парк, Чау Танх Дистрикт, провинция Хау Джианг, Социалистическая Республика Вьетнам.

**Организация-производитель:** «Vemedim Animal Health» / «Вимедим Энимал Хэлс», Сонг Хау Индастриал Парк, Чау Танх Дистрикт, провинция Хау Джианг, Социалистическая Республика Вьетнам.