

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Вимецеф 250 для лечения болезней бактериальной этиологии у крупного рогатого скота, свиней.

1. Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Вимецеф 250 (Vimecef 250).
Международное непатентованное наименование: цефкином. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.

В качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится:

Цефкином (в форме сульфата) – 25 мг

Вспомогательные вещества – до 1мл.

Стекланные флаконы объемом 100 мл. Стерильно.

2. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный препарат.

Цефкином, входящий в состав препарата – это цефалоспорин четвертого поколения широкого спектра действия, который действует путем подавления синтеза клеточной стенки. Препарат отличается высокой стабильностью против пеницилиназ и бета-лактамаз, активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включающих *Escherichia coli*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Haemophilus somnus*, *Arcanobacterium pyrogenes*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Prevotells spp.*, *Actinobacillus spp.* и *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

3. Показания к применению

Вимецеф 250 назначают для лечения бактериальных инфекций у крупного рогатого скота, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, чувствительными к цефкиному.

КРС: респираторные заболевания, вызванные *Pasteurella multocida* и *Mannheimia haemolytica*; дерматит, инфекционный яремный некроз и острый некробактериоз; острый мастит, вызванный *E.coli*.

Телята: септицемия, вызванная *E.coli*.

Свиньи: бактериальные инфекции легких и дыхательных путей, вызванных *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* и другими организмами, чувствительными к цефкиному. Синдром Мастит-Метрит-Агалактия (ММА) с *E.coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* и другими организмами, чувствительными к цефкиному.

Поросята: Снижение смертности при менингите, вызванном *Streptococcus suis*. Для лечения артрита, вызванного *Streptococcus ssp.*, *E.coli* и другими организмами, чувствительными к цефкиному. Эпидермиты (или умеренные высыпания), вызванные *Staphylococcus hyicus*.

4. Способ применения и дозы

Внутримышечно. Многократное введение. Перед применением тщательно встряхнуть.

КРС:

Болезни органов дыхания, дерматит, инфекционный яремный некроз и острый межпальцевый некробактериоз: 1 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 3-5 дней.

Острый *E. Coli* мастит с признаками системного участия: 1 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 2 дней.

Телята: 1 мл на 12.5 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней.

Свиньи:

Респираторные заболевания: 1-2 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней.

ММА: 1- 2 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 2 дней.

Поросята: менингит, артрит, эпидермит: 1-2 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 5 дней.

5. Период ожидания:

Мясо: КРС- 5 дней, свиньи – 3 дня.

Молоко: 24 часа.

6. Противопоказания

Гиперчувствительность к β -лактамам антибиотикам.

Не применять для животных с весом менее 1.25 кг.

7. Особые указания

Не применять по истечении срока годности.

Не допускается смешивать Вимецеф 250 в том же шприце с другими лекарственными средствами.

8. Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия

Известно, что перекрестная чувствительность к цефалоспоринолупу существует для бактерий, чувствительных к группе цефалоспоринов.

Из-за нежелательных фармакодинамических взаимодействий не применять цефкином одновременно с препаратами, действующими бактериостатически.

9. Побочные эффекты

Использование ветеринарного средства может привести к локализованной реакции тканей. Тканевые повреждения проходят через 15 дней после последнего введения ветеринарного лекарственного средства.

Аллергические реакции на цефалоспорины встречаются редко.

10. Срок годности и условия хранения

Срок годности - 2 года с даты производства. После вскрытия флакона препарат следует хранить в холодильнике в течение 28 дней. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре 0°C до +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

11. Условия отпуска

Без рецепта ветеринарного врача.

12. Меры личной профилактики

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Вимецеф 250. У гиперчувствительных людей возможен контактный дерматит.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Регистрационное удостоверение № 8067-10-22 ЗА выдано «Vemedim Animal Health» / «Вимедим Энимал Хелс», Промышленная зона Сонг Хау, коммуна Донг Фу, район Чо Тханх, провинция Хау Джианг, Социалистическая Республика Вьетнам.

Организация-производитель: «Vemedim Animal Health» / «Вимедим Энимал Хелс», Промышленная зона Сонг Хау, коммуна Донг Фу, район Чо Тханх, провинция Хау Джианг, Социалистическая Республика Вьетнам.