

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ МОЛОДНЯКА КРС

Эффективная профилактика болезней органов дыхания молодняка КРС обеспечивается в результате строгого выполнения схемы ветеринарно-профилактических мероприятий глубоководных коров и нетелей и технологии выращивания молодняка КРС.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ МОЛОДНЯКА КРС

Примечание: противомикробные препараты применяются на основании результатов лечебной эффективности и лабораторных исследований.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ СХЕМА №1

П/Л	Наименование	Доза	метод	Кратность
1	Виме-лайт IV	5 мл	в/м	однократно в первый день
	или СУПЕРАМИНО-С	7 мл/45 кг	в/м	однократно в первый день
2	Кофеин-бензоат натрия 20%	1-2 мл	п/к	2 раза в сутки до выздоровления
3	Сыворотка против эшерихиоза, сальмонеллеза, ИРТ, ПГ-3	40-60 мл	в/м	двукратно с интервалом 1-3 дня
4	10 % раствор норсульфазола	5 мл	и/т	1 раз в сутки 5 дней подряд
5	Раствор глюкозы 40 %	20-60 мл	в/в	2 раза в сутки до выздоровления
6	Бициллин-3	5000 ЕД /кг	в/в	двукратно с интервалом 3 суток

БРОНХОПНЕВМОНИЯ СХЕМА №2

П/Л	Наименование	Доза	метод	Кратность
1	Олиговит	5 мл	в/м	однократно в первый день
	или Супервита-М			1г на 2 литра питьевой воды
2	Кофеин-бензоат натрия 20%	1-2 мл	п/к	2 раза в сутки до выздоровления
3	Сыворотка против эшерихиоза, сальмонеллеза, ИРТ, ПГ-3	40-60 мл	в/м	двукратно с интервалом 1-3 дня
4	10 % раствор норсульфазола	5 мл	и/т	1 раз в сутки 5 дней подряд
5	Метафозол	15-25 мл	в/в	1 раза в сутки до выздоровления
Противомикробные препараты				
	Авимицин	1 мл/20 кг	в/м	однократно
	или			
	Амокси 20	1 мл/20 кг	в/м	При необходимости через 48 ч
	или			
	Анкоцтллин ЛА	1 мл/25 кг	в/м	При необходимости через 72 ч
	или			
	Вимиспиро Ф.С.П.	1мл/15 кг	в/м	Двукратно с интервалом 48 ч
	или			
	Виметрил 100	1 мл/20 кг	в/м	1 раз в сутки 3-5 дней подряд
	или			

Линсимицин	1 мл/10 кг	в/м	1 раз в сутки 2-4 дней подряд
или			
Окситетра 200 ЛА	1 мл/10 кг	в/м	При необходимости через 72 ч
или			
Пенстреп 20/20 ЛА	5-10/100 кг	в/м	При необходимости через 72 ч
или			
Тилмикофул дуо	1 мл/30 кг	в/м	При необходимости через 72 ч
или			
Флорфен 300	1 мл/15 кг	в/м, п/к	С интервалом 48 ч
или			
Форлоксин	1мл/20-25 кг	в/м	1 раз в сутки 3-5 дней подряд
или			
Цекин 250	1 мл/12,5 кг	в/м	1 раз в сутки 3 дня подряд
или			
Цептикет	1 мл/50 кг	в/м	1 раз в сутки 3 дня подряд
или			
Энросул плюс	1 мл/10-15 кг		1 раз в сутки 3-5 дней подряд
или			
Ривициклин-А	0,3 г/ кг	внутри	1 раз в сутки до выздоровления
или			
Тромексин	0,66 г/10 кг	внутри	1 раз в сутки 2-3 дня подряд
или			
Полибром-концентрат	1 г/10 кг	внутри	1 раз в сутки 3-5 дней подряд
или			
Юнимокс форте	30 мг/1 кг	внутри	1 раз в сутки 5 дней подряд