

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЖКТ) МОЛОДНЯКА КРС

Эффективная профилактика диспепсии новорожденных телят обеспечивается в результате строгого выполнения схемы ветеринарно-профилактических мероприятий глубокостельных коров и нетелей и технологии выращивания молодняка КРС.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЖКТ) МО- ЛОДНЯКА КРС

Примечание: противомикробные препараты применяются на основании результатов лечебной эффективности и лабораторных исследований (учет чувствительности выделенной культуры к антибиотикам)

ДИСПЕПСИЯ СХЕМА №1

№ п/п	Наименование	Доза	Метод	Кратность
1	Отвар коры дуба в день заболевания первые 2 выпойки вместо молока	2 лит	внутри	в последующее кормление добавляют по 250 мл в порцию молока до выздоровления
	Вимекат	8 мл	п/к	однократно
2	Кофеин-бензоат натрия 20%	1-2 мл	п/к	2 раза в сутки до выздоровления
3	Сыворотка против эшерихиоза	30 - 50 мл	в/м	суточную дозу вводят в 2-3 приема с интервалом 3-4 часа
4	Раствор глюкозы 40 %	20-40 мл	в/в	2 раза в сутки до выздоровления
Противомикробные препараты				
5	Биовит-Р	2,6 г на гол	внутри	1 раз в сутки до выздоровления
Если лечение не эффективно на 3-й день				
	Полибром-концентрат	1,0 г на 10 кг	внутри	1 раз в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Амстронг	0,1-0,2 г на 10 кг	внутри	1 раза в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Колисал 100	1 г на 380 кг	внутри	1 раза в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Норсульфазол	0,3 г на 10 кг	внутри	2 раза в сутки 3 дня подряд
или				
	Тримеразин	0,3 г на 10 кг	внутри	2 раза в сутки 3 дня подряд
или				
	Рэнровет 10%	0,2 г на 10 кг	внутри	1 раз в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Руболак	13мл на 35-65 кг	внутри	1 раза в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Юнимокс форте	0,3 мг на 10 кг	внутри	1 раз в сутки 5 дней подряд
или				
	Юнимокс гентамицин	1 г на 10 кг	внутри	1 раза в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Миликоли	0,5 мл/10 кг	внутри	1 раза в сутки 3-5 дней подряд
или				
	Нонон	250-300 гр/т корма	внутри	Постоянно

или				
	Драймикс №9	2-4 кг/т корма	внутрь	5-7 дней
или				
	Тилмо-вим 250	1 мл/20 кг веса	внутрь	2 раза в сутки 3-5 дней подряд

ДИСПЕПСИЯ СХЕМА №2

№ п/п	Наименование	Доза	метод	Кратность
	Супервита-М	1г/2 литра воды	внутрь	в течение 3-5 дней
1	Кофеин-бензоат натрия 20%	1-2 мл	п/к	2 раза в сутки до выздоровления
2	Сыворотка против эшерихиоза	30 - 50 мл	в/м	суточную дозу 30-50 мл вводят 2-3 приема с интервалом 3-4 часа
3	Кальция борглюканат	20-40 мл	в/в	2 раза в сутки до выздоровления
Противомикробные препараты				
4	Диастоп	10 мл/кг массы животного	внутрь	2 раза в сутки с интервалом 12 часов в течение 3 дней подряд

ДИСПЕПСИЯ СХЕМА №3

№ п/п	Наименование	Доза	метод	Кратность
1	Сакролит	100 г растворяют в 2,5 л теплой воды, внутрь		2-3 раза в день до исчезновения клинических признаков,
	Олиговит	5 мл	в/м	однократно
2	Кофеин-бензоат натрия 20%	1-2 мл	п/к	2 раза в сутки до выздоровления
3	Сыворотка против эшерихиоза	30 - 50 мл	в/м	суточную дозу 30-50 мл вводят 2-3 приема с интервалом 3-4 часа
4	Метафозол	15 - 25 мл	в/в	1 раза в сутки до выздоровления
или				
	Раствор Рингера-Локка	100-200 мл	в/в	1 раз в сутки до выздоровления
Телятам у которых 7% и больше обезвоживание внутривенная инфузия:				
	Виме-лайт IV	2 мл/кг массы	в/в	однократно
Противомикробные препараты				
5	Диастоп	10 мл/кг массы животного	внутрь	2 раза в сутки с интервалом 12 часов в течение 3 дней подряд
Если лечение не эффективно на 3-й день внутримышечно				
	Авимецин	1мл/20 кг	в/м	однократно
или				
	Окситетрациклин ЛА	1/10кг	в/м	при необходимости через 48 час
или				
	Амоген	1 мл/10 кг	в/м	1 раз в сутки в течение 2 дней
или				
	Виметрил 100	0,5 мл /10 кг	п/к	раз в сутки в течение 2 - 3 дней
или				
	Вимеспино Ф.С.П	1 мл на 15 кг	в/м	в течение 3-5 дней
или				
	Котрим 240	1 мл/10 кг	в/м	раз в сутки в течение 2 - 3 дней
или				

	Линсмицин	1 мл/10 кг	в/м	раз в сутки в течение 2-4 дня
или				
	Дизпаркол	1 мл/10 кг	в/м	двукратно с интервалом в 1 сутки