

Вакцина против энтерококковой инфекции телят, ягнят и поросят

Ставропольская БФ

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Вакцина изготовлена на основе культуры стрептококков серологического варианта D, сорбированной на геле гидроокиси алюминия и инактивированной формалином. По внешнему виду представляет собой прозрачную суспензию желто-коричневого цвета с незначительным бело-серым осадком. Расфасовывают по 100 мл в стеклянные герметически закрытые флаконы.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина индуцирует выработку специфических антител к возбудителям энтерококковой инфекции у молодняка сельскохозяйственных животных через 6 – 8 дней после повторной вакцинации. Напряженность иммунитета у животных составляет 4 месяца.

ПОКАЗАНИЯ

Назначают телятам, ягнятам и поросятам в целях специфической профилактики энтерококковой инфекции в неблагополучных или угрожаемых по данному заболеванию хозяйствах и индивидуальном секторе.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед иммунизацией необходимо простерилизовать шприцы и иглы. Для каждого животного используют отдельную стерильную иглу. Перед использованием флакон с вакциной необходимо энергично встряхнуть. Препарат вводят внутримышечно с внутренней поверхности бедра двукратно, с интервалом 10 – 14 дней в дозе:

Вид животного	Доза препарата на 1 животное, мл	
	Первая вакцинация	Вторая вакцинация
Телята	5	10
Ягнята	5	5
Поросята	5	5

В стационарно неблагополучных хозяйствах телят, ягнят и поросят прививают с первого дня жизни специфической энтерококковой сывороткой в профилактической дозе, а на 6 – 7 сутки их вакцинируют. При выявлении в ранее благополучном пункте заболевания молодняка энтерококковой инфекцией лечебные и профилактические мероприятия проводят в следующем порядке: больных и подозрительных в заболевании животных изолируют и проводят лечение энтерококковой сывороткой в комплексе с антибактериальными препаратами, клинически здоровых животных моложе 8-дневного возраста первоначально иммунизируют энтерококковой сывороткой в профилактических дозах, согласно инструкции по применению, а затем через 7 – 8 дней вакцинируют. Все клинически здоровые животные старше 8-дневного возраста подлежат профилактической иммунизации указанной выше вакциной.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

После применения вакцины у животных могут наблюдаться повышение температуры тела на 0,5 – 1,5 °С в течение первых 1 – 2 суток и незначительная отечность в месте введения препарата, которая самопроизвольно рассасывается в течение 3 – 4 дней и не требует дополнительного лечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Вакцинации не подлежат клинически больные энтерококкозом, с инфекционными и паразитарными заболеваниями, ослабленные и истощенные животные.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При проведении манипуляций с препаратом следует пользоваться резиновыми перчатками, особенно в случае наличия на руках ссадин и других повреждений кожи. При попадании вакцины на кожу или слизистые оболочки ее тотчас необходимо смыть струей воды или снять тампоном и затем отмыть водой. По окончании обработки руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом. Флаконы с остатками препарата утилизируют. Транспортировка и вывоз животных из хозяйства допускается через 12 дней после повторной иммунизации. Продукты уоя от вакцинированных животных реализуются без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте при температуре от 5 до 15 °С. Срок годности — 2 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФГУП «Ставропольская биофабрика», Россия.